




Gerinc-közeli érzéstelenítés




Gátmetszés




Fogóműtét



Lepényleválasztás



Császármetszés



## Betegtájékoztató

### Szülészeti fájdalomcsillapításról (Peridurális érzéstelenítés)

*Tisztelt Betegünk!*

*Ezen rövid tájékoztatót az Ön érdekében készítettük. Kérjük tekintse át gondosan, s amennyiben ezután is maradnak megválaszolatlan kérdései, forduljon bizalommal orvosához.*

A szülési fájdalom az egyetlen természetes fájdalom. Ennek csillapítására irányuló törekvések az orvoslás őskorába nyúlnak vissza. Nehéz olyan módszert találni, amely enyhíti, vagy teljesen megszünteti a vajúdás fájdalmait, de ugyanakkor a magzatra nem károsak a használt gyógyszerek. Napjainkban egyik legeredményesebben alkalmazott módszer a gerincközeli, szakmai nyelven lumbális epidurális (peridurális) érzéstelenítés.

A **gerincközeli (LPDA) érzéstelenítés** alkalmával a csontos gerinccsatorna és a gerincvelő külső burka közé egy erre alkalmas túvel speciális kanült vezetünk fel, helyi érzéstelenítés után.

A kanülon keresztül adagoljuk a fájdalomcsillapítást előidéző gyógyszert. Ezzel az eljárással elérhető, hogy a méh összehúzódó tevékenysége (fájások) megmaradnak, de az ezzel járó fájdalomérzés a szülés alatt megszűnik. Ezen fájdalomcsillapító eljárással műtéteket lehet elvégezni úgy, hogy a magzatot gyógyszerkárosodás nem éri, valamint elkerülhető a gépi altatás fokozott veszélye. Klinikai vizsgálatok igazolták, hogy az ily módon alkalmazott fájdalomcsillapítás mellett született újszülöttek jobb állapotban jöttek a világra, mint fájdalomcsillapítás nélkül.

A fájdalomcsillapítás a szülésnek csak egy bizonyos időszakában alkalmazható csak, megfelelő fájaštevékenység (5-6 percenként jelentkező, normális erősségű fájások) és minimum kétujjnyi, maximum háromujjnyi tágasságú méhszáj esetén. A túl korai, illetve túl késői alkalmazás a szülés menetét károsan befolyásolhatja.

Mint minden orvosi beavatkozásnak, így ezen fájdalomcsillapítási eljárásnak is lehetnek szövődményei:

- *csökkenhet* a méhizomzat összehúzódásának ereje és így a szülés ideje megnyúlhat,
- előfordulhat a kanülálás során a gerincvelő burkának, vagy valamelyik idegnek a *sérülése*, amelyek átmeneti kellemetlenséget okozhatnak, nagyon súlyos esetben bénuláshoz vezethetnek.

A páciens neve: .....

**Aláírással igazolom, hogy a szülészeti fájdalomcsillapítással kapcsolatos felvilágosítást megkaptam, ennek elvégzését ezt követően:**

Páciens aláírása

Férj (hozzátartozó) aláírása

kérem

.....

.....

nem kérem

.....

.....

Pécs, 20 ..... év ..... hó ..... nap

Felvilágosító orvos: .....