

Gyökér vizuális osztályozás
VIZUÁLIS OSZTÁLYBA SOROLÁS
Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen
A gyökérzet fejlődése kismértékben gátolt, elfogadható termőhelyen
A gyökérzeten látható károsodások (sebek és korhadások), csekély hibákkal rendelkező termőhelyen
Gyökérzet látható erős felszíni károsodása, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen
A gyökérzet erős, legalább 50 %-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen

Törzs vizuális osztályozás
A törzs nem károsult
Kisméretű károsodás (néhány felszíni seb)
A törzs egyértelmű károsodása (néhány felszíni seb és rothadási helyek)
A törzs erős károsodása (több nagyfelületű vagy mély rothadási seb, korhadások)
A törzs előrehaladottan károsult, elhalt, korhadt (oly mértékben, hogy statikai vagy tápanyag ellátási funkcióját nem képes ellátni)

Korona vizuális osztályozás
A korona formája (a fajra jellemzően) ép, a lombveszteség nem haladja meg a 10 %-ot
A lombveszteség 11-25 % közötti
Jelentős a lombveszteség
Erős koronakárosodás
Elhalt korona, teljes lombveszteség

Életképesség értékelése
A fa kitűnő állapotban van
Beavatkozással még hosszú ideig megtartható
A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt lecserélendő

VIZUÁLIS OSZTÁLYBA SOROLÁS

Egy évtizeden belül lecserélendő

Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás lehetősége miatt (baleset vagy építmény-
rongálás veszélye)

VIZUÁLIS OSZTÁLYBA SOROLÁS

osztályzat
5
4
3
2
1

osztályzat
5
4
3
2
1

osztályzat
5
4
3
2
1

osztályzat
5
4
3

VIZUÁLIS OSZTÁLYBA SOROLÁS

2
1